

Пытанні і заданні. 1. Для чаго птушкі праглынаюць дробныя каменьчыкі? 2. Чаму паўзуны могуць галадаць шмат дзён, а птушкі кормяцца вельмі часта? 3. Растлумачце прынцып дваінога дыхання птушак. 4. Апішыце рух крыві па вялікім або малым (на выбар) крузе кровазвароту. 5. Якую будову мае нервовая сістэма голуба шызага?

Мае натуралістычныя назіранні



Вывучыце паводзіны птушак.

- Пакладзіце ў кармушку шматок несалёнага сала. Назірайце, як хутка птушкі яго заўважаць.
- Ці павялічваецца колькасць птушак ля кармушкі?
- Загарніце другі шматок сала ў папяровы кулёк і пакладзіце яго ў кармушку. Назірайце, як хутка птушкі здабудуць корм.


§ 44. Размнажэнне, развіццё і паводзіны птушак

Успомніце: 1. Што ў будове ўнутраных органаў птушак спрыяе памяншэнню масы іх цела? 2. Па якіх прыметах птушкі адрозніваюцца ад паўзуноў?

Птушкі — раздзельнаполыя жывёлы. Адным відам птушак уласцівы палавы дымарфізм: самец мае заўважныя адрозненні ад самкі. У іншых відаў такія адрозненні адсутнічаюць.

Палавая сістэма. У самцоў ёсць *семяннікі*. Палавая сістэма самак прадстаўлена *адным* (левым) *яечнікам*. Адсутнасць правага яечніка — яшчэ адно прыстасаванне птушак да палёту, каб паменшыць масу цела. Яйцаклеткі ў яечніку развіваюцца паступова, у іх назапашваюцца пажыўныя рэчывы (жаўток). Па меры паспявання яйцаклеткі трапляюць у яйцавод, дзе адбываецца іх апладненне. Такім чынам, у птушак апладненне ўнутранае. Сценкі яйцавода выдзяляюць рэчывы, якія фарміруюць абалонкі яйца.

Будова яйца. У цэнтры знаходзіцца *жаўток*, акружаны жаўткавай абалонкай. На паверхні жаўтка аплодненага яйца ёсць *зародкавы дыск*. Ад жаўтка цягнуцца два бялковыя *канацікі*. Дзякуючы канацікам зародкавы дыск заўсёды знаходзіцца зверху (бліжэй да цёплага цела птушкі, якая наседжвае яйкі). Жаўток пагружаны ў *бялок*. Бялок — абалонка яйца, якая засцерагае жаўток ад пашкоджання.



Мал. 155. Будова яйца птушкі

Бялок акружаны двухслойнай *падшкарлупінавай абалонкай*. Пасля адкладкі яйца на тупым яго канцы два слаі падшкарлупінавай абалонкі разыходзяцца і ўтвараюць *паветраную камеру*. Яйцо пакрыта порыстай *шкарлупінай*, у склад якой уваходзіць карбанат кальцыю. Зверху шкарлупіны знаходзіцца *надшкарлупінавая абалонка*. Яна абараняе яйцо ад пранікнення мікраарганізмаў. Усе абалонкі яйца здольны прапускаць вільгаць і не перашкаджаюць газаабмену (мал. 155).

Размнажэнне і развіццё. Дзякуючы прыроджанаму інстынкту птушкі ствараюць пары, будуць гнёзды і наседжваюць яйкі. Пачатак размнажэння залежыць ад наяўнасці корму: да моманту з'яўлення птушанят яго павінна быць дастаткова. Напрыклад, птушанят грака кормяцца чарвякамі і насякомымі, якія жывуць у глебе, а іх лепш здабываць, пакуль расліны яшчэ невысокія. Вось чаму гракі выводзяць птушанят ранняй вясной. Ластаўкі кормяцца насякомымі, якія лётаюць у паветры, таму гнездавацца птушкі пачынаюць пазней, у перыяд актыўнага размнажэння насякомах.

Птушкі ў перыяд размнажэння ўтвараюць пары (пастаянныя або часовыя). Пары падбіраюцца не выпадкова. Дробныя і сярэднія птушкі (вераб'і, сініцы) аб'ядноўваюцца ў пары на адзін сезон. Буйныя жывуць парамі шмат гадоў (буслы, чаплі) або ўсё жыццё (лебедзі).

Некаторыя самцы гучна спяваюць, каб прыцягнуць увагу самак або пазначыць сваю тэрыторыю.


Такаванне — яшчэ адзін від палавых паводзін птушак (цецерукоў, глушчоў). Самцы збіраюцца разам для своеасаблівых гульняў або турніраў. Яны выдаюць асаблівыя гукі, распускаюць крылы і хвост, імкнучыся такім чынам быць як мага больш заўважнымі. Паміж самцамі ўспыхваюць кароткія сутычкі.



Чашападобнае гняздо
дразда-піскуна на дрэве



Гняздо жаўрука палявога
на зямлі



Гняздо ластаўкі
пад дахам дома

Мал. 156. Гнездаванне птушак

Гнездаванне. Большасць птушак адкладвае яйкі ў гнёзды. На дрэвах і ў кустах птушкі (напрыклад, *дразд-піскун*) будуць чашападобныя гнёзды. *Дзятлы*, *сініцы* і многія іншыя лясныя птушкі гняздуюцца ў дуплах. *Ластаўкі* будуць гнёзды пад стрэхамі будынкаў, карнізамі аконных ніш. *Качкі*, *журавы*, *жаўрукі* гняздуюцца на зямлі (мал. 156). Такія птушкі, як *язюлі*, падкладваюць свае яйкі ў гнёзды іншых птушак.



Звычайна язьюля падкладвае сваё яйка ў гняздо дробных птушак. Такая з'ява атрымала назву гнездавога паразітызму. Падрослае язьюля выкідае з гнязда яйкі ці ўжо птушанят «прыёмных бацькоў», а калі застаецца адно, то пачынае хутка расці (мал. 157).

Мал. 157. Птушаня язьюлі ў гняздзе чаротаўкі балотнай



Птушкі адкладваюць розную колькасць яек. Напрыклад, арлы, ястрабы, пінгвіны — 1–2 яйкі, а шэрая курапатка — 15–20. Развіццё зародка адбываецца пры пэўнай тэмпературы (каля 40 °C) і вільготнасці, гэтыя ўмовы ствараюцца птушкамі падчас наседжвання яек. Працягласць наседжвання яек розная: ад 14 сутак у дробных птушак (напрыклад, вераб'ёў) да 40 сутак у лебедзя або 60 сутак у грыфа. Часцей за ўсё клапацяцца аб патомстве самкі, але могуць займацца гэтым і самцы.

Тыпы развіцця птушанят. У адных відаў птушаняты з'яўляюцца на свет бездапаможнымі, сляпымі, голымі ці пакрытымі тонкім рэдкім пухам. Таму бацькі саграваюць іх цяплом свайго цела і кормяць. Птушаняты не пакідаюць гняздо, пакуль не пабяруцца ў перы і не навучацца лятаць. Такіх птушак называюць *гнездавымі* (гэта вароны, гракі, галубы, дзятлы, вераб'і, дразды і інш.).

У іншых відаў птушаняты з'яўляюцца на свет відушчымі і пакрытымі пухам. Ужо праз некалькі гадзін яны могуць ісці за бацькамі і самастойна карміцца (мал. 158). Роля дарослых асобін зводзіцца да абагравання птушанят у першыя дні жыцця, абароны вывадка ад драпежнікаў і дапамогі ў пошуках здабычы. Такіх птушак называюць *ывадкавымі* (гэта куры, цецерукі, качкі, гусі, лебедзі і інш.).



Мал. 158. Самка качкі-крыжанкі з вывадкам

Паводзіны птушак. Падчас гнездавання ў птушак праяўляецца інстынкт клопату аб патомстве. Акрамя таго, што яны наседжваюць яйкі, кормяць і абаграваюць птушанят, яны вучаць іх жыццёва неабходным навыкам: шукаць корм, адрозніваць ядомое ад неядомага, у выпадку небяспекі ісці за маці або хавацца ў зацішных месцах.

Пры з'яўленні ворага птушкі абараняюць гняздо, нападаючы на драпежніка, гучна крычаць, заклікаючы на падмогу суродзічаў. Супольная абарона гнёздаў характэрна асабліва для птушак, якія гняздуюцца вялікімі групамі (напрыклад, ластаўкі-зямялякі). У вывадкавых птушак самка адцягвае ўвагу драпежніка на сябе і адводзіць ад гнязда, прыкідваючыся параненай або знясіленай.

На працягу жыцця ў птушак выпрацоўваюцца ўмоўныя рэфлексы. Куры, гусі, качкі і іншыя свойскія птушкі пазнаюць голас чалавека, які іх корміць. Папугаі, вароны па ўказцы дрэсіроўшчыка здольны выконваць розныя трукі, а многія вучацца вымаўляць асобныя словы і фразы, сэнс якіх, вядома, не разумеюць. Увогуле паводзіны птушак больш разнастайныя і складаныя ў параўнанні з зямнаводнымі і паўзунамі. Гэта звязана з поўным фарміраваннем кары вялікіх паўшар'яў перадняга мозга.

Паўторым галоўнае. Птушкі — раздзельнаполыя жывёлы. Некаторыя віды характарызуюцца палавым дымарфізмам. Апладненне ўнутранае. Развіццё зародка адбываецца ў яйку, якое змяшчае пажыўныя рэчывы — жаўток. Па тыпе развіцця птушанят адрозніваюць гнездавых і вывадкавых птушак. Птушкам уласцівы клопат аб патамстве.

Пытанні і заданні. 1. Чаму палавая сістэма самак птушак прадстаўлена адным яечнікам? 2. Якая будова ў яйка птушкі? Чаму кладка ў паўзуноў можа дасягаць сотні яец, а ў птушак нашмат менш? 3. Назавіце тыпы развіцця птушанят. 4. Як птушкі клапацяцца аб патамстве? 5. З чым звязаны больш складаныя паводзіны птушак у параўнанні з земнаводнымі і паўзунамі?

§ 45. Прыстасаванасць птушак да сезонных з'яў прыроды

Успомніце: 1. Якое значэнне маюць гнёзды ў жыцці птушак? 2. Як змяніліся паводзіны птушак у сувязі з ускладненнем нервовай сістэмы?

У залежнасці ад адлегласці, на якую перамяшчаюцца птушкі ў розную пару года, іх дзеляць на тры асноўныя групы: *аселыя*, *вандроўныя*, *пералётныя*.

Аселыя птушкі. Калі колькасць корму і яго даступнасць не мяняюцца, птушкі жывуць у межах адной тэрыторыі круглы год і называюцца *аселымі*. Большасць іх відаў насяляе тропікі і субтропікі. У Беларусі можна сустрэць такіх аселых птушак, як *сініцы*, *сойкі*, *галубы*, *верабі*, *вароны*, *галкі*. У канцы лета і восенню некаторыя з іх

робяць запасы на зіму. Напрыклад, сініцы хаваюць насенне ў расколінах кары або сярод лішайніку на ствалах дрэў. *Сойка* (мал. 159) назапашвае жалуды і арэхі ў ямках на зямлі ці ў дуплах.



Мал. 159. Сойка звычайная

Вандроўныя птушкі. Незалежна ад перыяду размнажэння некаторыя птушкі (*снегіры*, *амялушкі*, *крыжадзюбы* (мал. 160), *дзятлы* і інш.) пастаянна пералятаюць з месца на месца ў пошуках корму або цяпла. Гэта *вандроўныя птушкі*. Яны могуць